

医学一般

問題 57 体表面から触れることができない動脈として、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 頸動脈
- 2 上腕動脈
- 3 とう骨動脈
- 4 腕頭動脈
- 5 後脛骨動脈

問題 58 過剰摂取により血圧を上昇させるものとして、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 カルシウム
- 2 鉄
- 3 ナトリウム
- 4 カリウム
- 5 マグネシウム

問題 59 脳血管疾患(cerebrovascular disease)に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

- 1 日本の三大死因の一つである。
- 2 要介護状態の原因疾患として最も多い。
- 3 脳卒中(stroke)には、脳梗塞(cerebral infarction), 脳出血(cerebral hemorrhage), くも膜下出血(subarachnoid hemorrhage)が含まれる。
- 4 脳梗塞の症状として、激しい頭痛が特徴的である。
- 5 心原性脳塞栓(cardiogenic cerebral embolism)の再発予防にワルファリンが用いられる。

問題 60 胃・十二指腸潰瘍(gastroduodenal ulcer)の発症に関連が深い病原体として、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 ヘリコバクター・ピロリ
- 2 カンピロバクター・ジェジュニ
- 3 腸炎ビブリオ
- 4 ノロウイルス
- 5 A型肝炎ウイルス

問題 61 日本における肝硬変(liver cirrhosis)の原因として、最も多いものを一つ選びなさい。

- 1 アルコール性肝炎(alcoholic hepatitis)
- 2 薬剤性肝炎(drug-induced hepatitis)
- 3 胆汁うっ滯性肝炎(cholestatic hepatitis)
- 4 B型肝炎(hepatitis B)
- 5 C型肝炎(hepatitis C)

問題 62 急性膀胱炎(acute cystitis)の症状として、通常見られないものを一つ選びなさい。

- 1 頻尿
- 2 発熱
- 3 尿混濁
- 4 排尿痛
- 5 細菌尿

問題 63 肥満に直接関連する病態として、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 うつ病(depression)
- 2 高中性脂肪血症(hypertriglyceridemia)
- 3 B型肝炎
- 4 気管支喘息(bronchial asthma)
- 5 骨粗鬆症(osteoporosis)

問題 64 約1か月間の血糖のコントロール状態を示す指標として、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 空腹時血糖値
- 2 血中インスリン値
- 3 血中コレステロール値
- 4 血中ヘモグロビン A1c 値
- 5 食後2時間血糖値

問題 65 骨粗鬆症の特徴として、誤っているものを一つ選びなさい。

- 1 骨量が増加する。
- 2 低身長化がみられる。
- 3 骨折しやすい。
- 4 脊柱の変形がみられる。
- 5 高齢者に多い。

問題 66 高齢者の感覚器障害に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 白内障(cataract)では、眼圧が上昇する。
- 2 加齢黄斑変性症(age-related macular degeneration)^{おうはん}は、手術で治癒する。
- 3 網膜中心動脈閉塞症(central retinal artery occlusion)では、突然的に視力が低下する。
- 4 老人性難聴(presbycusis)では、特に低音域の聴力が低下する。
- 5 味覚障害により、苦味を強く感じる。

問題 67 有床診療所に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 医師又は歯科医師でない者は管理者になることはできない。
- 2 10床以上の入院設備を有することはできない。
- 3 入院は48時間以内が原則である。
- 4 開設には厚生労働大臣の許可が必要である。
- 5 複数の診療科を標榜^{ひょうぼう}することはできない。

問題 68 在宅医療に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 主治医は「地域医療支援病院」の医師でなければならない。
- 2 保健所は在宅で療養する患者の個別支援を行うことはない。
- 3 静脈注射は医師でなければ行えない。
- 4 在宅での緩和ケアは保険診療の対象外である。
- 5 24時間対応可能な在宅療養支援診療所が制度化されている。