

<領域：こころとからだのしくみ>

発達と老化の理解

問題 69 高齢者の年齢規定に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 老齢厚生年金は55歳以上の者に対して支給される。
- 2 老人福祉法では原則として60歳以上の者を施策の対象としている。
- 3 介護保険法の第一号被保険者の年齢は65歳以上である。
- 4 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療制度は70歳以上の者を対象としている。
- 5 世界保健機関(WHO)では70歳以上と定義している。

問題 70 老年期の発達に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 老性自覚の出現年齢には個人差がある。
- 2 疾病は老性自覚の出現に影響しない。
- 3 社会的役割は定年により喪失する。
- 4 精神機能は一貫して低下する。
- 5 サクセスフルエイジングは客観的な幸福感のことである。

問題 71 老化に伴う身体の変化の特徴として、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 皮膚表面が湿潤化する。
- 2 味覚の感受性が高まる。
- 3 血中ヘモグロビン量が増加する。
- 4 疾病罹患時に定型的な症状が出現する。
- 5 免疫機能が低下する。

問題 72 かゆみを伴うことが通常見られない疾患として、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 糖尿病(diabetes mellitus)
- 2 心疾患(heart disease)
- 3 慢性腎不全(chronic renal failure)
- 4 肝疾患(liver disease)
- 5 胆道疾患(biliary tract disease)

問題 73 老化に伴う運動器系の変化として、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 骨密度の低下
- 2 関節液の増加
- 3 関節可動域の拡大
- 4 筋量の増加
- 5 下肢筋力の増強

問題 74 高齢者の気分障害(mood disorder)に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 双極性感情障害(bipolar affective disorder)は老年期に初発することが多い。
- 2 抑うつ気分は若年者と比べ重度であることが多い。
- 3 感情失禁を伴うことは少ない。
- 4 老年期うつ病(senile depression)は身体症状と関連することが多い。
- 5 年齢が高くなるほど自殺率も高い。

問題 75 急性心筋梗塞(acute myocardial infarction)の痛みとして、正しいものを一つ選びなさい。

- 1 ニトログリセリンがよく効く。
- 2 高齢になるほど痛みを訴えない人の割合が高くなる。
- 3 狭心症(angina pectoris)の痛みに比べて軽度なことが多い。
- 4 安静にすると消失する。
- 5 数分以内に消失する。

問題 76 高齢者の疾患の特徴に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

- 1 潜在的な臓器障害が多い。
- 2 完治可能な急性疾患が多い。
- 3 多疾患の合併が多い。
- 4 個人差が大きい。
- 5 薬の副作用が出やすい。