

認知症の理解

問題 77 認知症(dementia)の人に対する地域密着型サービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 介護療養型医療施設
- 2 認知症老人徘徊感知機器にんちしょうろうじんはいかいかんちききの貸与
- 3 居宅介護住宅改修
- 4 認知症対応型通所介護
- 5 介護予防訪問介護

問題 78 小規模多機能型居宅介護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 住み慣れた地域で住み続けることに役立つ。
- 2 ケアマネジメント(care management)は外部機関に委託する。
- 3 1事業所の登録定員は29人以下である。
- 4 本体事業所への看護師・准看護師の配置は義務づけられていない。
- 5 「泊まり」を基本にサービスを展開する。

問題 79 認知症(dementia)の中核症状として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 判断力が低下する。
- 2 不安な状態が続く。
- 3 抑うつ状態が続く。
- 4 介護者に暴力をふるう。
- 5 忘れたことを自覚している。

問題 80 せん妄(delirium)に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 睡眠と覚醒かくせいのリズムは正常である。
- 2 意識レベルは清明である。
- 3 せん妄中の出来事を覚えている。
- 4 薬剤によって生じることがある。
- 5 症状の変動は少ない。

問題 81 レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)の症状として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 具体的な幻視が現れる。
- 2 もの盗られ妄想が現れる。
- 3 常同行動が現れる。
- 4 万引きなど反社会的な行動が現れる。
- 5 シヤント手術によって改善が期待できる。

問題 82 血管性認知症(vascular dementia)と比べたとき、アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)により多くみられる特徴として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 発症は女性に多い。
- 2 上肢や下肢に麻痺まひがある。
- 3 症状は階段状に悪化する。
- 4 感情失禁がある。
- 5 多発性脳梗塞たはつせいのうこうそく(multiple cerebral infarction)がある。

問題 83 適切な治療をすれば、認知症(dementia)の症状が大きく改善する可能性がある疾患として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)
- 2 前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)
- 3 血管性認知症(vascular dementia)
- 4 クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease)
- 5 慢性硬膜下血腫まんせいこうまくかけっしゅ(chronic subdural hematoma)

問題 84 認知症(dementia)の行動・心理症状(BPSD)として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 実行機能障害
- 2 失語
- 3 記憶障害
- 4 失認
- 5 徘徊はいかい

問題 85 高齢の認知症(dementia)の人への対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 使い慣れた道具を、新しい便利なものに変える。
- 2 部屋の家具の配置を、飽きないように毎月変える。
- 3 部屋やトイレに、表示や目印をつける。
- 4 部屋の照明は、できるだけ明るくする。
- 5 食事の雰囲気よりも、栄養の摂取を優先する。

問題 86 Cさん(75歳、男性)は、認知症(dementia)の妻を自宅で介護している。

Cさんは、いつも明るく介護方法の勉強にも熱心である。最近、妻は排泄はいせつの失敗が増え、下着の交換や陰部清拭がたびたび必要になってきた。通所介護(デイサービス)職員との会話で、Cさんは、「妻に対して腹立たしく思う自分が情けない。妻にすまないと思う」と、初めて気持ちを語った。

Cさんに最初に行う対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 介護方法について指導する。
- 2 何事も気にしないように励ます。
- 3 新しい介護用品を紹介する。
- 4 介護を代行するサービスを提案する。
- 5 気持ちの訴えを受容する。